

N°10 – 15 octobre 2026

ACTUALITES

JARDINS ORNEMENTAUX

- Buis - pyrales
- Pins - processionnaires

EN BREF

- Potagers
 - o Choux : aleurodes, piérides
 - o Cucurbitacées : oïdium
 - o Haricots : acariens tétranyques tisserands
 - o Tomates : toujours quelques récoltes, *Tuta absoluta*
- Méthodes de prophylaxie
 - o Nettoyer et assainir
 - o Protéger
 - o Concevoir
 - o Planter

A SURVEILLER

- *Agrilus anxius*, l'agrite du bouleau classé Organisme de Quarantaine Prioritaire

NOTES NATIONALES Biodiversité & Santé des agro-systèmes : **dernières notes nationales : Trognes, Mares et Pollinisateurs**

Retrouvez l'ensemble des bulletins parus [sur notre site](#).

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV JEVI

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs formés et accompagnés par un animateur régional, rédacteur du BSV. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le BSV donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, serres de collection, jardins privés, etc.).

Rejoignez le réseau de votre région et participez à l'enrichissement des BSV tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Retrouvez gratuitement
les BSV sur le site de la
[DRAAF des Pays de la Loire](#)



Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
[Polleniz](#)



SOMMAIRE

JARDINS ORNEMENTAUX.....	3
Buis.....	3
Pyrales : reprise des vols selon les sites !.....	3
Pins.....	5
Processionnaires : stades L3 et première procession observée en secteur précoce	5
EN BREF.....	6
Potagers.....	6
Choux : aleurodes - vols et pontes de piérides.....	6
Cucurbitacées : présence d'oïdium.....	7
Haricots : baisse de rendements liée aux acariens tétranyques	7
Tomates : récoltes de fin de saison et <i>Tuta absoluta</i> toujours active	7
Méthodes de prophylaxie.....	7
Nettoyer et assainir	7
A SURVEILLER.....	11
<i>Agrilus anxius</i>	
L'agrile du bouleau classé Organisme de Quarantaine Prioritaire	11
NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ	14



JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

Pyrales : reprise des vols selon les sites !

Réseau d'observation


Secteurs d'Erdre et Gesvres et de Derval, Pays Nantais, plateau du Segréen, Haut Anjou, les Mauges, régions d'Angers, de Laval et de Mayenne, Pays Fléchois, cœur du Bocage Vendéen et région yonnaise. 19 pièges au total.

Surveillance

Les pièges installés par les observateurs du BSV JEVI afin de suivre l'évolution des vols du papillon mâle (monitoring) permettent de détecter les émergences de papillons qui n'auraient pas pu être évitées à partir des foyers larvaires et d'anticiper l'apparition de nouvelles générations.

Observations

Après avoir indiqué la fin généralisée des vols dans le dernier BSV, c'était sans compter sur un troisième petit pic de fin de saison, observé sur certaines parcelles uniquement ; la plupart des pièges ayant été retirés après la longue période sans capture.



Analyse et gestion du risque

Là où des vols sont toujours enregistrés, il convient de se tenir vigilant vis-à-vis des éclosions, puis l'arrivée de nouvelles larves ([cycle biologique ICI, page 4](#)).

Supprimez manuellement les premières chenilles que vous observerez. Inspectez bien l'intérieur de vos buis !

Financé par

En complément de la suppression manuelle des chenilles, la taille (et l'évacuation !) des jeunes rameaux de buis a également montré de bons résultats.



Là où les chenilles sont présentes en grand nombre et avec des défoliations importantes, il est possible de traiter à l'aide de méthodes de biocontrôle. Pour cet usage, il existe des produits à base d'huile essentielle d'orange ou à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* (Btk). Les gestionnaires de JEV **professionnels** peuvent utiliser également un insecticide de biocontrôle autorisé à base de spinosad. [Liste des produits de biocontrôle, ICI](#)

Il est important, pour obtenir une bonne efficacité du traitement, de tailler les buis très touffus avant la pulvérisation et de mouiller le feuillage jusqu'au point de ruissellement. Pour être détruites, les chenilles doivent ingérer suffisamment de produit (dose létale minimale). Il est inutile (et interdit !) de surdoser, mais il faut soigner la qualité de la pulvérisation (homogène, y compris à l'intérieur de la végétation, en utilisant une buse à turbulence et éventuellement avec un agent mouillant).

Attention au lessivage par les pluies, consultez la météo pour intervenir à bon escient. Il faut trois heures au minimum sans pluie après un traitement au Btk pour obtenir l'efficacité escomptée.

De plus, si vous utilisez une seule substance active, il est vivement conseillé de n'effectuer qu'un seul traitement par génération cela dans le but d'éviter d'éventuels phénomènes de baisse d'efficacité progressive du produit sur les populations, à la dose homologuée dans les conditions d'application indiquées. Ainsi, lors de l'observation des premières chenilles et des premiers dégâts, mieux vaut attendre 3-4 jours, afin d'agir sur la majorité des larves. Vous économiserez ainsi des traitements coûteux et, plus généralement, vous préserverez la biodiversité, car des produits comme le Btk visent les larves de tous les lépidoptères (papillons), pas seulement la chenille de la pyrale du buis...

Et toujours pour éviter l'apparition d'éventuels phénomènes de résistance des chenilles de pyrales du buis aux traitements larvicides à base de Bt, il est judicieux pour les gestionnaires de JEV pro d'alterner d'une fois sur l'autre, un produit autorisé à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *azawai* et de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. À noter aussi, la pertinence d'alterner des produits à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* issus de souches différentes (souche ABTS-351, SA-11, SA-12).

Méthodes alternatives



Dans le cadre des travaux SaveBuxus (programme coordonné par Plante et Cité et ASTREDHOR), les éléments pour la gestion des populations de pyrale du buis qui ressortent sont :

- **Prophylaxie**

Supprimer les feuilles mortes et autres débris présents dans, sur, et autour du buis concerné.

Supprimer manuellement ou mécaniquement (appareil à air ou eau sous pression, souffleur ...) les stades du ravageur en présence dans le cas d'une faible infestation.

- **Suivi/Monitoring**

Observer minutieusement tous les nouveaux pieds achetés ou à planter.

Surveiller les buis de manière régulière et avec soin (jusqu'au cœur de la plante) à la recherche de chenilles hivernantes pour intervenir le plus tôt possible en adaptant les méthodes de protection.

Surveiller les vols des papillons avec des pièges à entonnoir associés à la phéromone spécifique de la pyrale d'avril à octobre.

- **Biocontrôle**

A la reprise d'activité des chenilles hivernantes, des produits à base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* peuvent être positionnés pour interrompre le cycle de la pyrale.

Pour éviter l'apparition d'éventuels phénomènes de résistance des chenilles de pyrales du buis aux traitements larvicides à base de Bt, il est judicieux pour les gestionnaires de JEVI pro d'alterner d'une fois sur l'autre, un produit autorisé à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *azawai* et de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*.

A noter aussi, la pertinence d'alterner des produits à base de *Bt* subsp. *kurstaki* issus de souches différentes pour les gestionnaires de JEVI pro. Stratégie valable également pour les particuliers (jardiniers amateurs) - (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche ABTS-351, *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* SA-11, *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* SA-12).

Pins

Processionnaires : stades L3 et première procession observée en secteur précoce

Présentation – Biologie – Surveillance - One Health, une seule santé

Page 4 du [BSV JEVI n°4](#), disponible [ICI](#).

Depuis le 25 avril 2022, cette espèce est classée espèce nuisible à la santé humaine dans le code de la Santé Publique.

[Infos / One Health](#)

Observations

Sur la côte Atlantique - en 44 - le stade principal observé pour les chenilles est le stade L3, avec des nids en formation. Comparativement aux années précédentes, ils sont plus gros donc plus en avance.

Des pré-nids ont été observés en quantité mais pour le moment, la densité des nids soyeux apparents n'est pas proportionnelle à celle des pré-nids observés. Au sein des pré-nids, il a été observé des mortalités de chenilles ou des pré-nids vides. On peut supposer que les très fortes chaleurs estivales ont impactées le développement des chenilles de premiers stades.

Autres observations : il n'y a quasiment pas de nids sur les arbres secs, qui ont particulièrement souffert des canicules cumulées cette année. Donc on suppose que les papillons n'ont pas été pondre sur ces arbres ou que ces pontes n'ont pas abouti.

Enfin, observation ponctuelle mais intéressante pour le réseau : une première procession de nymphose a été observée à la Barbâtre (85). Commune de l'île de Noirmoutier, ce secteur est particulièrement précoce compte-tenu des conditions climatiques locales (microclimat océanique ensoleillé, plus doux et humide que le reste de la région).

(Graphe de capture de papillons dans le dernier [BSV JEVI n°9](#) en page 6).

Financé par

Analyse et gestion du risque

Pour intervenir, il convient de privilégier la période avant le troisième stade larvaire, qui est URTICANT ! D'autant que les tous premiers stades sont plus sensibles aux traitements microbiologiques.

Il est également possible de procéder à l'échenillage des nids dès les premières observations ; port des EPI (équipements de protection individuelle) indispensable à partir du stade L3 !

Autre solution : associer des feuillus aux conifères pour les nouvelles plantations et installer des nichoirs pour les oiseaux (=prédateurs). Les mésanges charbonnières sont particulièrement friandes des chenilles processionnaires du pin, surtout pendant les stades non urticants. Vous pouvez construire des nichoirs en bois naturel, sans colle (privilégier les vis ou chevilles de bois) ni peinture ou vous en procurer un en matériaux naturels. Un trou de 32 mm convient aux mésanges charbonnières, espèce la plus intéressante en la matière.

Retrouvez différentes [méthodes de lutte ICI](#)

Enfin, d'ici un à deux mois, selon les températures et les différentes zones de la région, ce seront des processions de chenilles que nous constaterons : informations sur [la conduite à tenir face aux processions ICI](#).

Des écopièges peuvent également être positionnés, ils permettent de leurrer les chenilles qui descendent lors de leurs processions et de les piéger dans des sacs remplis de terre/compost. Vous pouvez dès à présent prévoir vos commandes, leurs poses pouvant être effectuées actuellement.



EN BREF

Potagers

Choux : aleurodes - vols et pontes de piérides

Observations

Concernant les aleurodes, ce ravageur est observé ponctuellement dans un potager, sans dégât important.

Des vols de piérides sont toujours signalés. Dans certains jardins, des pontes associées sont également identifiées et écrasées ; le jardinier concerné précise même que cette saison est plus importante que les précédentes pour ce ravageur, dans son potager. D'autres particuliers, à l'inverse, sont étonnés de ne pas en voir davantage.



© F GASTINEL – Jardins d'amateurs

Pontes de piérides du chou

Analyse et gestion du risque

En pages 6 et 7 du [BSV JEVI n°6 du 2 juillet 2026](#).

Cucurbitacées : présence d'oïdium

Observations

Observation de saison : des symptômes de cette maladie sont signalés de manière généralisée sur l'ensemble de la région et dans la plupart des potagers.

Analyse et gestion du risque

La culture et la production étant actuellement en fin de saison, tout traitement serait inutile.

Haricots : baisse de rendements liée aux acariens tétranyques

Observations

La présence d'acariens tétranyques tisserands aura largement impacté cette culture cette année. Beaucoup de pieds ont été touchés voire, arrachés par les jardiniers, faute de développement possible. Les semis les plus précoces ont le mieux réagi car, plus avancé, ils ont pu de nouveau produire après les attaques, amenant à une récolte correcte.



© D GUÉRIF - Jardins d'amateurs

Symptômes d'oïdium – courges

Tomates : récoltes de fin de saison et *Tuta absoluta* toujours active

Observations

Cette culture arrivée en fin de saison produit toujours, les fruits continuent de mûrir et les rendements sont plutôt bons pour cet automne.

Des chenilles de noctuelles sont ponctuellement observées, les impacts sont moindres.

Concernant *Tuta absoluta*, les vols se maintiennent.

Analyse et gestion du risque

Il conviendra de procéder à un nettoyage sanitaire rigoureux après la culture, pour assainir les rangs et serres impactés cette année.

Tuta absoluta : en page 7 du [BSV JEVI n°6 du 2 juillet 2026](#)



© M-C & C LOISON - Jardins d'amateurs

Chenille de noctuelle – tomates

Méthodes de prophylaxie

Nettoyer et assainir

Suite à des infections cryptogamiques qui ont pu toucher le potager et le verger, il est important de les assainir (= réduction du potentiel infectieux pour le printemps prochain). Voici quelques bonnes pratiques à adopter et à mettre en œuvre en fin de culture.

On peut : déchiqueter, composter, éliminer toutes repousses, plants et fruits infectés.

Potager

Arracher les plants fanés, les parties végétales pouvant être infestées (ex : par des pupes de ravageur), les légumes contaminés ; puis les supprimer.

Désinfecter et ranger les tuteurs, piquets, pots vides...

Substances de base pour la désinfection :

- vinaigre (max. 10%) dilué : 50mL pour 1L d'eau
- peroxyde d'hydrogène <5%

(L'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps, car incompatibilité). Cliquer sur les liens pour accéder aux fiches Recette.

Outils

Nettoyer et désinfecter vos outils de jardinage avant de les ranger.

Allées

Un coup de balai de cantonnier suivi d'un rinçage suffit à nettoyer les allées couvertes par les mousses et algues, qui deviennent glissantes par temps pluvieux.

Aucun traitement n'est justifié dans ces situations à risque de transfert des produits vers les points d'eau.

Bordures

Afin d'avoir des bordures nettes sans traiter, couper le gazon au pourtour des massifs.

Pelouse

Les feuilles mortes tombées au sol favorisent le développement des mousses et de certaines maladies. Ainsi, il est possible de les broyer (à la tondeuse - fonction mulching) et de les laisser sur place. Elles serviront de nourriture aux micro-organismes du sol et aux lombrics, ces derniers rendront le sol plus drainant. Une autre solution consiste à les ramasser. Dans ce dernier cas, elles peuvent alors servir de paillage ou être compostées (=déchets bruns) en alternance avec les déchets de fruits et légumes (=déchets verts).

Serres et châssis

Éviter le développement de la pourriture grise en aérant par beau temps. Nettoyer régulièrement les plantes gardées en hivernage, en enlevant les feuilles jaunes et flétries (= précaution contre les maladies).



Désinfection des tuteurs



Ramassage des feuilles mortes

Protéger

Financé par

Il est important d'anticiper l'arrivée des premiers froids. Ainsi, lorsque les températures baisseront, vous devrez suivre attentivement l'évolution de ces dernières et notamment l'arrivée des premières gelées.

Des plantes en bon état physiologique sont plus résistantes aux maladies et ravageurs. Afin de leur assurer une bonne reprise végétative au printemps prochain et éviter tout traitement inutile, pensez à protéger du froid et du gel vos plantes sensibles (artichauts, dahlias, ...) ; avec feuilles mortes, voile, paille, bâche, etc. Utilisez ce que vous avez sous la main.

Lorsque la saison sera plus avancée, en cas de gel ou de neige, évitez de marcher sur la pelouse et ne touchez aux branches des arbres et arbustes que pour enlever les excès de neige (risque de déformation pour certains persistants).



Pose d'un voile d'hivernage


Concevoir

Profitez des mois plus calmes, comme novembre ou décembre, pour dessiner le plan du potager de l'année prochaine. L'idéal est d'effectuer une rotation des cultures. Si des planches sont déjà définies, cela sera d'autant plus facile. Sinon, 2027 peut être une première année d'essai !

La rotation des cultures permet d'assainir le sol et de limiter le potentiel de contamination pour le printemps suivant. Sur le plan phytosanitaire, cette bonne pratique de jardinage limite le développement des foyers parasites (champignons et bactéries pathogènes, nématodes phytoparasites, larves terricoles de type taupin, vers blancs de hanneton, ...).

La rotation permet également une restructuration du sol. La première année est la plus fastidieuse, mais une fois bien conçue, il vous suffira de faire « tourner » les planches de cultures. Et pour les plus « mordus », des associations bénéfiques entre les plantes peuvent permettre de repousser certains ravageurs.

Plus d'informations sur le site internet « Jardiner autrement » et en cliquant sur la vignette :



Pensez à bien archiver les variétés cultivées, notes indispensables pour adapter celles convenant le mieux à votre potager et retenir les plus résistantes ou les mieux adaptées.

Enfin, ne négligez pas la réflexion sur l'arrosage et l'eau au jardin. Si ce n'est pas encore le cas, réfléchissez à la récupération des eaux de pluie, ressource précieuse en période de sécheresse, via des récupérateurs et autres moyens de désimperméabilisation de votre jardin pour laisser l'eau s'infiltrer au plus proche, via des petites noues végétalisées par exemple ou autres solutions dans le guide [Je débranche ma gouttière](#).

Planter

À partir du mois de novembre - et sa fameuse Sainte Catherine ! - ce sera le bon moment pour planter des fruitiers en conteneurs ou racines nues, et également d'autres sujets.

Il conviendra alors de repérer auparavant les microclimats de votre jardin, facilement observables après une gelée blanche (= coins froids, angles de tourbillons).

Et bien que nous constatons, comme conséquence du dérèglement climatique, à certaines saisons un climat plus sec et chaud, évitez malgré tout de planter en pleine terre des essences trop sensibles au climat de notre région car nous connaissons également à d'autres moments des épisodes de fortes pluviométries, courts mais très intenses, durant lesquels les sols sont saturés en eau (=asphyxie racinaire). En situation de difficulté et souffrance, ces essences non adaptées pourraient développer des maladies et donc engendrer des interventions.

Pour les fruitiers, il est également conseillé de choisir un porte-greffe rustique et adapté au climat local, ainsi qu'à votre type de sol (calcaire, acide, ...).

Préférez également des variétés résistantes, comme celles tolérantes à la tavelure pour les pommiers (par exemple : Retina, Nela, Florina, Ariane, etc.)

Lors de la plantation, il est nécessaire de creuser une fosse conséquente en rapport avec le volume racinaire du sujet à planter : 2 à 3 fois plus large et plus profonde. Il ne faut pas hésiter à drainer le fond de la fosse (cailloux, sable grossier,...) et griffer les bords, les racines ne supportant pas l'asphyxie.

Pour une meilleure reprise, taillez celles qui sont blessées (avec un outil désinfecté) et les praliner (boue de terre argileuse + amendement : fumier/compost/...). Il peut également être mis en place une cuvette d'arrosage.

Respectez les distances de plantation (un arbre/arbuste grandit !) : c'est éviter le confinement et privilégier une bonne aération du feuillage ; autre bonne pratique pour se prémunir des maladies et ravageurs !

Il ne faut pas négliger les bonnes pratiques de plantation des végétaux : bien implantés, ils seront en meilleure santé et plus résistants.

Enfin, planter des arbres, c'est aussi et surtout apporter de l'ombre et de la fraîcheur dans son jardin, solution indispensable à mettre en place pour les étés à venir...





A SURVEILLER

Agrilus anxius

L'agrile du bouleau classé Organisme de Quarantaine Prioritaire

Ce coléoptère originaire du continent nord-américain, appartenant à la famille des *Buprestidae*, est classé OQP - Organisme de Quarantaine Prioritaire.

Rappel - classement des ONR

Informations dans le BSV JEVI n°1, page 14, [en cliquant ICI](#).

Description

Les adultes sont de forme allongée et étroite et disposent d'une tête enfouie dans le thorax. De couleur noire à bronze, avec des reflets métalliques cuivrés, ils mesurent 7 à 12 mm de long (taille similaire à nos agriles européens : entre 5 mm et 1,2 cm).


Comme d'autres espèces d'agriles, la larve est de couleur blanche à crème, annelée, avec un thorax plus large. Elle passe par 4 stades larvaires et atteindra 2 cm au dernier stade.

Pour fiabiliser l'identification, un diagnostic en laboratoire est indispensable.

Biologie

Dans son aire d'origine, le cycle biologique de cette espèce se déroule sur 1 à 2 ans.

Les adultes ont une durée de vie de 2 à 5 semaines et sont présents entre les mois de mai et d'août. Ils se nourrissent de feuilles, à la cime. L'émergence des adultes se fait via des trous de sorties caractéristiques en forme typique de « D » (3-5 mm de diamètre). Les œufs ovales, de couleur crème puis jaune, mesurent 1,5 mm. Les pontes s'effectuent au niveau des anfractuosités de l'écorce. Deux semaines après, les larves forent l'écorce et se dirigent sous cette dernière au niveau des vaisseaux du phloème (sève élaborée), la longueur des galeries peut atteindre 1 mètre.



Adulte et galeries (généralement pleines de sciures) sur bouleau - *Agrilus anxius*



Émergence d'un adulte - *Agrilus anxius*



Larve - *Agrilus anxius*

L'hivernation peut s'effectuer à tous stades. La nymphose a lieu vers le centre de l'arbre, dans la partie de l'aubier (bois tendre - vaisseaux du xylème). Elle s'y déroule de mai à juillet.

Propagation

Il n'existe aucune information sur la dispersion naturelle des adultes d'*A. anxius* par le vol. Cependant, en conditions de laboratoire, le foreur du frêne émeraude (*Agrilus planipennis*), de taille similaire à *A. anxius*, peut voler en moyenne 1,3 km par jour, certains individus dépassant 7 km par jour.

Le commerce de plants, de bois, de grumes et les matériaux d'emballage en bois de *Betula*, ainsi que le bois de chauffage et les copeaux infestés participent à sa dissémination sur de longues distances.

Plantes hôtes

Betula spp.

Au Canada, l'agrite du bouleau s'attaque en particulier aux espèces exotiques, telles que le bouleau blanc *Betula pendula* ou *B. pubescens*. Mais il s'installe également sur les bouleaux indigènes lorsqu'ils sont faibles ou lors d'une période de stress : bouleau à papier *B. papyrifera*, bouleau gris *B. populifolia*. L'espèce *B. nigra* ne semble pas affectée.

Distribution

Présent en Amérique du Nord, ce ravageur aurait déjà décimé des dizaines de milliers de bouleaux au Canada.

À ce jour, il n'a pas été détecté en Europe.

Impacts

L'agrite du bouleau est un ravageur secondaire qui s'installe sur des arbres préalablement affaiblis : stress hydrique, défeuillaison, âge avancé... Les repas des adultes ont un impact limité sur la végétation des arbres occupés. Néanmoins, les larves d'*Agrilus anxius* sont capables d'engendrer la mort de son hôte en seulement 2 à 3 ans.

Les espèces européennes de bouleau sont considérées comme plus sensibles que celles présentes dans son aire d'origine.


On observe généralement une diminution de la canopée à partir de la cime des arbres vers le bas et souvent, uniquement via la flèche.



© E. Jendek

Agrilus anxius (AGRLAX) - <https://gd.eppo.int>

Trou de sortie (adultes) en forme de D - *Agrilus anxius*



© G. Heaton - USDA Forest

Dépérissement de la cime d'un bouleau - *Agrilus anxius*

La formation de jeunes pousses peut également apparaître le long du tronc. À travers l'écorce, le tissu cicatriciel présent le long des galeries peut également transparaître, le tronc prenant alors par endroits un aspect « boursouflé ».

En cas de suspicion de détection, alerter sans délai Polleniz ou la DRAAF-SRAL PDL qui procéderont aux vérifications nécessaires à leur identification.

*© VL Muilenburg and DA Herms,
Ohio Agricultural Research and
Development Center, The Ohio
State University, Wooster, OH, USA*




Tissu cicatriciel se formant le long des galeries larvaires sous l'écorce - *Agrilus anxius*

Pour aller plus loin

[Site de l'INRAE - ephytia](#)

[Fiche de reconnaissance SORE - plateforme ESV](#)

[Site OEPP](#)



© G. Heaton - USDA Forest

Mortalité des branches de la couronne et jeunes rejets le long du tronc - *Agrilus anxius*




NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ



Financé par

Portail ECOPHYTO JEVI PRO

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les professionnels des JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr



Site internet : Jardiner Autrement

Un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les Jardiniers amateurs et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.jardiner-autrement.fr/.



Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières, réalisées par un réseau d'épidémiologie en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. Polleniz dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Groupe technique restreint : DRAAF Pays de la Loire – Polleniz – Animatrice inter-filières – Jardiniers amateurs

Observations : Polleniz, jardins d'amateurs, services espaces verts de collectivités (Chemillé en Anjou, Laval, Mayenne, Sainte Hilaire de Riez), ONF.

Animation : Polleniz

Coordination, renseignements et rédaction : Francine Gastinel – bsv.jevi@polleniz.fr

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV JEVI n°10 du 15 octobre 2026 »

Financé par



Bulletin de Santé du Végétal Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures – Région Pays de la Loire
BSV n°10 du 15 octobre 2026