

ACTUALITÉS

Réseau d'observation	P.1
A Surveiller	P.2
Prévision Météorologique	P.3
Evaluation des risques	P.4
Alliacées <i>Thrips</i>	P.5
Apiacées <i>Mouches, alternaria</i>	P.7
Brassicacées <i>Altises</i>	P.8
Cucurbitacées <i>Pucerons, Thrips, Oidium</i>	P.9
Fraisiers <i>Tenthredes</i>	P.11
Salades <i>Noctuelles, Maladies</i>	P.12
Solanacées <i>Punaises, Doryphores, Maladies</i>	P.13
Note Nationale Biodiversité	P.15
A Surveiller : <i>Thrips palmi</i>	P.16

Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant [ici](#)

RESEAU D'OBSERVATION

• Localisation des parcelles

Pour la rédaction de ce BSV, les observations ont été réalisées dans des parcelles fixes et flottantes dans le 49 à Grézillé, Concourson-sur-Layon, Lys Haut Layon, Villebernier, Corné et Loire-Authion ; dans des parcelles flottantes dans le 44, dans le 85 à La Roche sur Yon, Ste-Gemme-la-Plaine et Chanverrie dans des parcelles flottantes dans le 79 à St Martin de Sanzay.

• Cultures suivies



ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal
sur le web...

- www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
- www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
- www.polleniz.fr

... ou inscrivez-vous en ligne pour être
informé directement par mail de chaque
nouvelle parution (formulaire en bas de
page) : <https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/sinformer/etre-agriculteur-lessentiel-a-savoir/bulletins-techniques-et-de-preconisation/bulletins-vegetal/bulletin-de-sante-du-vegetal/>

A SURVEILLER

PLANTES DANGER

Avec la mondialisation des échanges, des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être introduits sur de nouveaux territoires et mettre en péril la bonne santé des plantes. Face à cette menace, il est important que chaque détenteur de végétaux, réalise une surveillance de ces derniers, visant à la recherche d'organismes réglementés, nuisibles aux végétaux.

L'enjeu de cette surveillance est, en cas d'apparition d'un tel organisme sur notre territoire, que sa première détection soit suffisamment précoce pour que des mesures d'assainissement soient déployées avant qu'il ne se soit largement et irréversiblement répandu.

En cas de détection ou de suspicion de présence d'un organisme de quarantaine, veuillez en informer sans délai la DRAAF à l'adresse mail suivante : sral.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr



Exemple du scarabée japonais récemment détecté en France

Pour la filière maraichage, vous trouverez ci-dessous l'ensemble des organismes réglementés émergents actuellement surveillés sur le territoire français :

Tomato Leaf Curl New Delhi virus (ToCLNDV)

Thrips jaune du théier, *Scirtothrips dorsalis*

Thrips sud-africain des agrumes, *Scirtothrips aurantii*

Thrips du melon ou thrips du palmier, *Thrips palmi*

Mouche mineuse des légumes, *Liriomyza sativae*

La mouche orientale des fruits, *Bactrocera dorsalis*

La Mouche éthiopienne des cucurbitacées, *Dacus ciliatus*

Légionnaire d'automne -Papillon, *Spodoptera frugiperda*

Teigne de l'oranger, Faux carpocapse, *Thaumatotibia leucotreta*

Noctuelle de la tomate, noctuelle des soies du maïs, *Helicoverpa zea*

Le scarabée ou hanneton japonais, *Popillia japonica*

Altise de la pomme de terre, *Epitrix spp.*

Teigne guatémaltèque de la pomme de terre, *Tecia solanivora*

Flétrissement Bactérien du Haricot, *Curtobacterium flaccumfaciens*

Flétrissement bactérien, *Ralstonia solanacearum*

Virus de l'enroulement apical de la betterave, *Beet Curly Top Virus*



Scirtothrips dorsalis



Dacus ciliatus



Papillon d'*Helicoverpa zea* (source CABI)



Chenilles d'*Helicoverpa zea* (photo P. PORTER)

Les espèces du genre *Epitrix* réglementées en Europe



Adultes et larve de teigne guatémaltèque (source OEPP)



Symptôme du ToBRFV sur le fruit de la tomate: marbrures et décolorations. (© Dr Prof. Salvatore Davino, Avrii 2021. EPO Global Database <https://gd.epo.int/>)

PREVISION METEOROLOGIQUE

	Pluviométrie 2026 mm (S26)	T min (S26)	T max (S26)
Allonnes (49)	248 mm (+1)	21,4 °C	42,4 °C
Challans (85)	425 mm (+4,2)	16,4 °C	42,8 °C
St-Philbert-de-Grand-Lieu (44)	442 mm (+0,4)	15 °C	42,2 °C
La Planche (44)	441 mm (+1,5)	15 °C	43,6 °C
Laval (53)	357 mm (+0)	17,2 °C	41,6 °C
La Roche-Sur-Yon (85)	428 mm (+0,6)	15 °C	43 °C
Loire-Authion (49)	343 mm (+0)	15,8 °C	42,8 °C
Le Mans (72)	387 mm (+0)	18 °C	41,8 °C


Allonnes (49)					Challans (85)				
Auj.	Ven.	Sam.	Dim.	Lun.	Auj.	Ven.	Sam.	Dim.	Lun.
25 juin	26 juin	27 juin	28 juin	29 juin	25 juin	26 juin	27 juin	28 juin	29 juin
0 mm	0,3 mm	1,4 mm	8,4 mm	0 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,9 mm	0 mm
43 °C	35 °C	33 °C	26 °C	30 °C	40 °C	29 °C	31 °C	24 °C	24 °C
27 °C	22 °C	22 °C	20 °C	16 °C	24 °C	20 °C	21 °C	19 °C	16 °C
9 km/h	5 km/h	7 km/h	6 km/h	7 km/h	11 km/h	4 km/h	6 km/h	7 km/h	9 km/h
20 km/h	11 km/h	15 km/h	12 km/h	12 km/h	22 km/h	9 km/h	15 km/h	15 km/h	14 km/h
St-Philbert-de-Grand -Lieu (44)					Le Mans (72)				
Auj.	Ven.	Sam.	Dim.	Lun.	Auj.	Ven.	Sam.	Dim.	Lun.
25 juin	26 juin	27 juin	28 juin	29 juin	25 juin	26 juin	27 juin	28 juin	29 juin
0 mm	0,2 mm	0,8 mm	0,3 mm	0 mm	0 mm	0,9 mm	1,8 mm	3 mm	0 mm
41 °C	32 °C	32 °C	25 °C	29 °C	42 °C	34 °C	32 °C	26 °C	29 °C
25 °C	20 °C	21 °C	20 °C	16 °C	27 °C	23 °C	21 °C	19 °C	15 °C
10 km/h	5 km/h	7 km/h	8 km/h	8 km/h	8 km/h	6 km/h	6 km/h	7 km/h	5 km/h
21 km/h	11 km/h	16 km/h	16 km/h	12 km/h	19 km/h	15 km/h	16 km/h	17 km/h	11 km/h
Laval (53)					<p>Les températures sont caniculaires sur cette fin de semaine et resteront élevées semaine prochaine. Ces conditions sont très favorables au développement des ravageurs estivaux tels que les punaises, les acariens, les altises et les thrips. Surveillez vos cultures.</p> <p>L'augmentation des températures devrait permettre de diminuer la pression maladies. Sous abri, pensez à aérer pour diminuer le taux d'humidité.</p>				
Auj.	Ven.	Sam.	Dim.	Lun.					
25 juin	26 juin	27 juin	28 juin	29 juin					
0,2 mm	0,3 mm	3,2 mm	3,3 mm	0 mm					
42 °C	33 °C	31 °C	25 °C	28 °C					
27 °C	22 °C	20 °C	18 °C	14 °C					
7 km/h	6 km/h	6 km/h	7 km/h	7 km/h					
19 km/h	14 km/h	15 km/h	16 km/h	12 km/h					

EVALUATION DES RISQUES

Alliacées (Poireaux, Oignons)



Cucurbitacées (Concombres, Courgettes, Melons)



Apiacées (Carottes)




Fraisiers




Salades (Laitues, Mâches, Epinards)



Brassicacées (Radis, Choux)



Solanacées (Aubergines, Poivrons, Tomates, Pommes de terre)



REMARQUES

Dans ce bulletin vous trouverez les symboles suivants :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur. Ils sont consultables à l'adresse <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>









Ce symbole indique qu'il existe des résistances vis-à-vis d'au moins une famille de produits phytosanitaires pour ce ravageur. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.r4p-inra.fr

ALLIACEES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
 Teignes du poireau	49	Poireaux	Piégeages : 0 à Beaufort en Vallée (49) et Grézillé (49)	
Mouches mineuses	44	Poireaux	Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> 0 à Divatte-sur-Loire (44) 0 à Machecoul (44) 0 à La Planche (44) 0 à St-Julien-de-Concelles (44) 0 à Arthon en Retz (44) 	
Mouches des semis	44	Poireaux	Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> 1 à Divatte-sur-Loire (44) 2 à Machecoul (44) 2 à La Planche (44) 3 à St-Julien-de-Concelles (44) 3 à Arthon-en-Retz (44) 	
 Thrips	44, 49	Oignons, Poireaux	<u>Oignons</u> : 80% des plants touchés sous abri et 100% des plants en plein champ à Corné (49) <u>Poireaux</u> : 20% des plants avec des individus avec 80% de dégâts à Corné (49) Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> 59 à Divatte-sur-Loire (44) 327 à Machecoul (44) 92 à La Planche (44) 141 à St-Julien-de-Concelles (44) 24 à Arthon-en-Retz (44) 	

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les ravageurs se stabilise à l'exception des thrips. Les conditions caniculaires sont très favorables au développement des thrips, soyez vigilants.

Gestion du risque



Pour limiter les dégâts des mouches des cultures légumières, mettre en place des filets insect proof. De nombreux aeolothrips ont été observés dans les parcelles, ce sont des prédateurs de thrips. Observez vos cultures pour détecter la présence des auxiliaires.

ALLIACEES



• Maladies

Modèle Miloni - Mildiou de l'oignon

Maladies	Localisation des parcelles	Dates de contamination	Dates théoriques de sorties des taches	Evolution du risque
Mildiou oignon	Allonnes (49)	4, 6 et 16 mai	7 juin	
Mildiou oignon	Les Rosiers sur Loire (49)	3 et 6 mai	17 et 20 mai	
Mildiou oignon	St-Mathurin-sur-Loire (49)	1 et 6 mai	16 et 21 mai	
Mildiou oignon	Chaillé-les-Marais (85)	3 et 15 mai	7 juin	
Mildiou oignon	Challans (85)	11 mai	4 juin	

Analyse du risque

Au vu des observations et du modèle Miloni, le risque concernant les maladies est faible. Les conditions climatiques ne sont pas favorables au développement du mildiou.

Gestion du risque

La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.





Mildiou sur oignon - Crédit photo : ephytia

APIACEES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
Mouches des semis	44	Carottes	Piégeages : 3 à Chaumes en Retz (44) et 8 à Machecoul (44)	
Mouches de la carotte	44	Carottes	Piégeages : 0 à Chaumes en Retz (44) et à Machecoul (44) Présence de dégâts dans le 44	

Analyse du risque

Au vu des observations et des conditions météo, le risque concernant les ravageurs diminue.

Gestion du risque

Pour limiter les dégâts des mouches des cultures légumières, mettre en place des filets insect proof. De nombreux auxiliaires sont présents dans les parcelles (coccinelles adultes et larves, syrphes) ce qui permet une bonne régulation des pucerons.

• Maladies

Observations en parcelles

Maladies	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution de la pression
Alternaria	44	Carottes	Présence dans le 44	



Alternaria, symptômes sur feuilles – crédit photo ephytia



Alternaria, symptômes sur pétioles – crédit photo ephytia

A PIACEES



Modèle Septocel - Septoriose du céleri

Maladies	Localisation des parcelles	Dates de contamination	Dates théoriques de sorties des taches	Evolution du risque
Septoriose céleri	Allonnes (49)	10 mai	31 mai	
Septoriose céleri	Challans (85)	12, 13 et 16 juin	08 et 09 juin	

Analyse du risque

Au vu des observations et du modèle Septocel, le risque concernant la septoriose augmente. Des températures chaudes avec une forte humidité sont favorables au développement de la septoriose.

Gestion du risque






La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.

B BRASSICACEES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
 Piérides	49	Choux	Présence d'œufs dans le 49	
Altises	44, 49	Choux, Radis	<u>Radis</u> : Dégâts dans le 44 <u>Choux</u> : présence dans le 44, 100% des plants à Grézillé (49) avec une pression très importante et 100% de dégâts, présence à Concourson sur layon (49)	
 Teignes	49	Choux	0 à Grézillé (49), présence d'œufs dans le 49	

Analyse du risque

La pression ravageurs se stabilise au vu des observations. Les conditions climatiques à venir sont très favorables aux altises, soyez vigilants.

Gestion du risque


Observez vos cultures pour détecter la présence des auxiliaires. Un bassinage peut gêner les altises.

B RASSICACEES (Suite)



• Maladies

Observations en parcelles

Maladies	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution de la pression
B Mildiou	44	Radis	Présence dans le 44	

Analyse du risque

Au vu des observations et des conditions météorologiques, le risque concernant les maladies augmente.

Gestion du risque





La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.

C UCURBITACEES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
B Pucerons	49, 85	Concombres, Courgettes	<u>Concombres</u> : 100% des plants à Loire-Authion (49), 40% à Corné (49) et 37% à La Roche sur Yon (85) <u>Courgettes</u> : 30% des plants à Loire Authion (49) et Corné (49)	
B Thrips	49	Concombres, Courgettes	<u>Concombres</u> : 50% des plants à Loire-Authion (49) <u>Courgettes</u> : 50% à Loire-Authion (49) et 20% à Corné (49)	
Sésamies	85	Melons	Piégeage : 28 à La Roche sur Yon (85)	
B Acariens	85	Concombres	10% des plants touchés à Chanverrie (85)	

CUCURBITACEES (Suite)



• Ravageurs

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les ravageurs augmente globalement. Surveillez vos cultures, les conditions météo sont favorables à leur développement.

Gestion du risque

Observez vos cultures et leur environnement pour identifier la présence d'auxiliaires pour lutter contre les ravageurs. Un bassinage peut limiter les populations de thrips.



Méthodes alternatives





Des larves de coccinelles, des parasitoïdes, des syrphes, des larves d'aphidoletes et des aeolothrips ont été observées dans les parcelles de concombres cette semaine. Observez vos cultures pour détecter la présence des auxiliaires. Les aeolothrips sont des prédateurs de thrips, les autres auxiliaires sont des prédateurs de pucerons mais ce sont également des prédateurs de nombreux ravageurs des cultures légumières à différents stades.

• Maladies

Observations en parcelles

Maladies	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution de la pression
 Oïdium	49	Courgettes	100% des plants à Loire-Authion (49)	

Modèle Milmel- Mildiou du melon

Maladies	Localisation des parcelles	Dates de contamination	Nombre de génération	Evolution du risque
Mildiou melon	Allonnes (49)	19 mai, 30 mai, 2 juin, 4 juin, 28 juin	6	
Mildiou melon	Chaillé-les-Marais (85)	19 mai, 2 juin, 6 juin, 25 juin, 27 juin, 28 juin	7	

Analyse du risque

Au vu des observations et des conditions météo, le risque concernant les maladies augmente.

Gestion du risque


La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.

FRAISIERS



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
 Tenthredes	49	Fraisiers	10% des plants à Loire-Authion (49)	

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les ravageurs augmente.

Gestion du risque

Observez vos cultures et leur environnement pour identifier la présence d'auxiliaires pour lutter contre ces ravageurs.



Les fleurs des fraisiers sont ouvertes.

La réglementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a été modifiée pour renforcer la **protection des abeilles et des insectes pollinisateurs** : l'arrêté ministériel du 20 novembre 2021 prévoit désormais une évaluation et une autorisation spécifiques pour l'utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques en période de floraison. Il fixe en outre une **plage horaire pendant laquelle ces traitements peuvent être réalisés**. Ces prescriptions s'ajoutent à celles fixées dans les autorisations de mise sur le marché. Pour en savoir plus consultez :

- [L'arrêté abeilles](#) (général)

SALADES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
Mouches des semis	44	Mâches	Dégâts dans le 44	=
B Mouches mineuses	44	Mâches	Dégâts dans le 44	=
B Noctuelles défoliatrices <i>Autographa gamma</i>	44, 49, 79	Salades, Jeunes pousses	Dans le 44, augmentation de la pression Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à Villebernier (49) • 3 à St Martin de Sanzay (79) • 0 à Grézillé (49) 	↗
Noctuelles terricoles <i>Agrotis segetum</i>	49, 79	Salades	Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> • 0 à Villebernier (49) • 3 à St Martin de Sanzay (79) 	=
B Noctuelles de la tomate <i>Helicoverpa armigera</i>	49, 79, 85	Salades	Piégeages : <ul style="list-style-type: none"> • 3 à Villebernier (49) • 7 à St Martin de Sanzay (79) • 7 à La Roche sur Yon (85) 	↗
Altises	44	Jeunes pousses d'épinards	Dégâts dans le 44	=
B Thrips	49	Salades	40% des plants touchés à Corné (49), pression forte à Grézillé (49)	↗

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les thrips et les noctuelles augmente. Les conditions météorologiques sont très favorables au développement des thrips et des altises, soyez vigilants.

Gestion du risque








Pour limiter les dégâts des mouches des cultures légumières, mettre en place des filets insect proof. Des orius sont présents dans les parcelles de salades. Ce sont des prédateurs de thrips mais aussi de pucerons, d'acariens et d'aleurodes, observez vos cultures.

SALADES (Suite)



• Maladies

Observations en parcelles

Maladies	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution de la pression
 Thielaviopsis	44	Mâches	Présence dans le 44	
 Bactériose	44	Mâches	Présence dans le 44	
 Botrytis	44	Mâches	Présence dans le 44	
Phoma	44	Mâches	Présence dans le 44	

Analyse du risque

Au vu des observations et des conditions météorologiques, le risque concernant les maladies est stable.

Gestion du risque








La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.

SOLANACEES



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
 Pucerons	49, 85	Aubergines, Poivrons, Tomates	<u>Aubergines</u> : 12% des plants à La Roche sur Yon (85), 20% à Loire-Authion (49) <u>Poivrons</u> : 15% à Loire-Authion (49) <u>Tomates</u> : 50% des plants à Loire-Authion (49), 20% à Corné (49) et 6% à Ste-Gemme-la-Plaine (85)	
<i>Tuta Asboluta</i>	49, 85	Tomates	0 individus piégés à Loire-Authion (49), présence de dégâts à Chanverrie (85)	
 Doryphores	49	Aubergines	10% à Corné (49)	
 Thrips	49	Tomates	Présence à Loire-Authion (49)	

SOLANACEES (Suite)



• Ravageurs

Observations en parcelles

Ravageurs	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution des populations
Punaises <i>Nezara viridula</i>	49	Aubergines	Présence à Loire-Authion (49)	=
Punaises <i>Lygus</i>	49	Aubergines	Présence à Corné (49) et Lys Haut Layon (49)	=
Altises	49	Aubergines	Présence à Corné (49)	=
B Acariose bronzée (<i>Aculops lycopersici</i>)	85	Tomates	Forte pression dans le 85	↗

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les ravageurs se stabilise. Les conditions météo sont favorables aux acariens notamment ceux responsables de l'acariose bronzée, soyez vigilants.

Gestion du risque

Les auxiliaires présents naturellement dans la parcelle peuvent maîtriser efficacement les populations de pucerons, à condition qu'ils soient suffisamment développés au moment où survient le risque. Des orius, des coccinelles, des syrphes, des aphidoletes et des chrysopes ont été observés cette semaine.

• Maladies

Observations en parcelles

Maladies	Localisation des parcelles	Cultures	Observations	Evolution de la pression
Verticilliose	85	Aubergines	Présence dans le 85	=
B Botrytis	85	Tomates	Présence à Ste-Gemme-la-Plaine (85)	↗

Analyse du risque

Au vu des observations, le risque concernant les maladies augmente.

Gestion du risque

La gestion des maladies sous abri passe par une bonne aération pour limiter l'augmentation de l'hygrométrie.

NOTE NATIONALE BIODIVERSITE



Les curseurs de risque utilisés ont pour objectif de synthétiser l'ensemble des informations : observations, période de risque, données météo, modèles, ... sauf lorsque cela est précisé

1 = risque faible; 2 = risque assez faible; 3 = risque moyen; 4 = risque assez fort; 5 = risque fort

RÉSEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2026 PAYS DE LA LOIRE

Rédacteur : Chloé PASQUIER, Claire NICOLAS -CAPDL-CDDL- chloe.pasquier@pl.chambagri.fr, claire.nicolas@pl.chambagri.fr

Directeur de publication : Philippe DUTERTRE - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.

Groupe technique restreint : CDDL - SRAL - GDM - CDDM - POLLENIZ.

Observateurs : CDDL - CDDM - Coopérative Rosée des champs - Fleuron d'Anjou - GAB44 - CAB - GDM - Coopérative Noirmoutier - CLAUSE - Terrena Semences - Vilmorin - CNPH La Ménitrie - CECOVAL - L'Aubépin - Maraichers.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CDRPDL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles.

Avec le soutien financier de

A SURVEILLER : THrips PALMI

PLANTES
en
DANGER

- **Biologie**

Thrips palmi est un ravageur polyphage surtout des Cucurbitacées et des Solanacées. Il est aussi observé sur haricot, pois, pomme de terre, soja, tournesol.

Après la nymphose, les adultes sortent du sol et vont sur les feuilles ou fleurs de la plante où ils pondent leurs œufs. Le second stade larvaire se déplace vers le sol, s'y développe et se métamorphose. Les pièces buccales sont de type suceur.

L'adulte femelle mesure environ 1,3 mm et possède un corps jaune clair à soies noirâtres.

- **Symptômes**

A la surface des feuilles, les piqûres nutritionnelles le long des nervures donnent un aspect argenté à la feuille.

Sur des plantes sévèrement touchées, on observe un rabougrissement des feuilles et des pousses terminales, une déformation des fruits.

Comme toutes les espèces de *Thrips*, il est fréquemment observé au niveau des fleurs.

- **Confusions possibles**

Autres espèces de *Thrips*, notamment *Thrips flavus* (sans importance économique). Des examens au microscope sont nécessaires pour les différencier.

- **Répartition géographique**

L'insecte est absent en France et dans les autres états membres de l'union européenne mais souvent observé lors des contrôles à l'importation.

- **Transmission**

Organisme non transmis par les semences.

- **Statut réglementaire**

Organisme réglementé en France et faisant l'objet d'une lutte obligatoire sur tout le territoire de l'union européenne.

- **Procédures réglementaires**

Thrips palmi est de lutte obligatoire sur le territoire national (arrêté du 24 mai 2006 modifié et annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié) et européen (AI A1 de la directive européenne 2000/29/CE) : destruction des plants contaminés.

Source : ephytia



Symptôme sur feuille d'aubergine (crédit photo : ephytia)