

Grandes cultures (récolte 2020)

5 octobre 2020 N° 31

Rendements en maïs grain et en tournesol attendus inférieurs à la moyenne

La récolte du maïs grain commence mi-septembre au sud de la Loire. Fin septembre, l'évaluation très provisoire du rendement régional indique une baisse de 2 quintaux par rapport au rendement moyen 2015-2019.

L'été sec favorise le développement des tournesols sans pression de maladies. En revanche, des dégâts d'oiseaux sont signalés jusqu'à fin juillet. Le rendement régional est prévu en baisse de 4 quintaux par rapport au rendement moyen quinquennal.

Pour les colzas de la récolte 2021, le manque d'eau jusqu'à la mi-septembre complique les semis et les levées, notamment en Sarthe et dans l'est de la Mayenne. Les pluies de la seconde quinzaine de septembre sont bénéfiques aux cultures.

	S = Superficie (1 000 ha) R = Rendement (q/ha) P = Production (1000 q)	Loire	Maine et Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire	
		Atlantique					Total	% 2020/19
Céréales								
Blé tendre	S	39,3	71,1	66,8	71,9	55,1	304,3	-21,6
	R	55	58	61	54	49	56	-28,3
	P	2 172,4	4 144,3	4 092,1	3 903,6	2 717,0	17 029,4	-43,7
Orge d'hiver (y.c. escourgeon)	S	8,7	14,1	12,4	17,1	7,8	60,1	-18,6
	R	49	52	51	45	45	49	-32,1
	P	432,3	738,1	639,1	776,9	354,6	2 941,0	-44,7
Orge de printemps	S	6,5	4,4	4,4	4,0	6,3	25,6	+333,4
	R	46	45	41	28	47	42	-35,3
	P	295,4	196,2	177,0	111,5	294,5	1 074,7	+180,2
Maïs grain (*) (n.c semences)	S	12,5	23,4	8,7	43,6	44,5	132,8	+21,0
	R	71	76	77	86	88	83	+3,7
	P	886,8	1 790,0	676,2	3 735,6	3 926,6	11 015,3	+25,5
Avoine	S	1,1	1,1	1,4	1,2	0,4	5,2	+12,7
	R	45	35	36	32	45	38	-36,7
	P	50,9	37,2	52,1	38,6	19,5	198,2	-28,7
Triticale	S	4,5	5,5	5,6	4,8	4,8	25,2	-25,5
	R	47	49	47	43	40	45	-29,2
	P	209,6	269,0	264,1	206,0	191,6	1 140,3	-47,2
Blé dur	S	0,2	2,1	0,1	0,3	15,8	18,5	-19,0
	R	58	57	52	50	51	52	-30,7
	P	9,3	121,4	5,2	16,6	809,2	961,6	-43,9
Toutes céréales	S	81,3	139,1	103,2	148,0	143,7	615,2	-9,1
	P	4 469	8 107	6 089	9 012	8 702	36 379	-28,8
Oléoprotéagineux								
Colza	S	9,7	14,3	14,0	24,5	9,2	71,7	+6,3
	R	26	27	29	27	26	27	-18,0
	P	251,1	384,9	405,7	660,7	238,6	1 941,1	-12,7
Tournesol	S	3,9	13,7	2,7	6,3	24,8	51,4	+56,9
	R	30	23	24	22	20	22	-4,3
	P	116,4	315,1	65,8	138,2	495,8	1 131,2	+50,1
Pois protéagineux	S	2,1	3,0	2,3	2,9	2,4	12,7	+21,9
	R	32	32	31	27	22	29	-31,5
	P	66,2	95,4	72,2	77,0	53,5	364,2	-16,5
Productions fourragères								
Maïs fourrage	S	56,7	47,5	88,3	38,7	59,1	290,3	+4,2
	R	135	133	124	104	140	128	+24,6

Source : DRAAF SRISE- FranceAgriMer, estimation au 1er OCTOBRE 2020

(*) Maïs grain : y compris maïs grain humide (soit environ 16 300 ha) ; Évolution de surface grain + fourrage : + 9 %

DRAAF Pays de la Loire - SRISE - 5, rue Françoise Giroud - CS 67516- 44275 Nantes cedex 2 Tél : 02 72 74 72 40