Bulletin de Santé du Végétal

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

BSV ORNEMENT N°11 DU 23 OCTOBRE 2026

La météo du week-end et début de semaine prochaine s'annonce pluvieuse et agitée avant le retour d'un temps plus sec et ensoleillé.

SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28	JEUDI 29	VENDREDI 30
9° / 17°	12° / 17°	8° / 19°	13° / 19°	8° / 16°	7° / 16°	7° / 15°
30 km/h	20 km/h	20 km/h	25 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
70 km/h	60 km/h	45 km/h	50 km/h			

(Source : Météo France—Angers 23/10/2026 à 12h00. Retrouvez les données météo actualisées : ici)

ACTUALITES

Les ravageurs :

Pucerons, thrips, acariens : à surveiller

Pépinières : cicadelles, cécidomyies sur agapanthe, cochenilles farineuses et australiennes

Cultures florales : aleurodes sur poinsettia, chenilles défoliatrices

Ravageurs du réseau de piégeage :

Duponchelia fovealis
Captures en baisse.
Détection de chenilles

Maladies cryptogamiques

Cultures florales et vivaces
Quelques cas d'oïdium

Cultures florales
Botrytis sur nouvelles cultures

Notes Nationales

Ecophytopic

Liste produits de biocontrôle

Ravageurs à surveiller

Pucerons : à surveiller

Cultures florales : des foyers sont toujours observés par endroit sur chrysanthèmes avec parfois de la fumagine.

Pépinières : quelques foyers localisés sont relevés sur certaines cultures notamment sur *Arbutus sp.*, *Camellia sp.*, *Salix sp.*, *Malus sp.* (pucerons cendrés), *Citrus sp., Lagerstroemia sp., Pittosporum sp. ….*

Gestion du risque : détecter au plus tôt les foyers et suivre l'évolution des populations et des auxiliaires. A surveiller.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

- **Aide à l'identification des pucerons polyphages couramment rencontrés en horticulture ICI**
- **Pour en savoir plus sur les pucerons et leurs ennemis naturels : Encyclop'Aphid**



ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le site de la DRAAF, le site de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire ou sur le site de Polleniz

… ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution : https://ecophyto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/surveillance-biologique-du-territoire/bulletin-de-sante-du-vegetal

Avec le soutien financier de
CHAMBRE D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
POLLENIZ PROTÉGER LE VÉGÉTAL ET NOTRE ENVIRONNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Thrips

Cultures florales : observations de *Thrips setosus* sur *Geum sp.* et *Echinothrips sp*. sur poinsettia.

Evaluation du risque : les journées ensoleillées et la floraison de certaines plantes sensibles sont favorables à leur développement. Vigilance sur les dégâts directs et indirects (transmission de virus tels que TSWV, INSV, IYSV…). A surveiller.

Pépinières : *Heliothrips sp.* a été relevé sur différentes cultures notamment *Arbutus sp*., *Myrtus sp*., *Viburnum sp*., *Mahonia sp*..

Présence de thrips observée également sur différents végétaux notamment *Aralia sp*., *Pieris sp., Choisya sp., Fatsia sp., Griselinia sp., Aucuba sp., Osmanthus sp*., *Pittosporum sp.*.

Prophylaxie :

- Examen des végétaux entrant dans l'entreprise. Cette étape est essentielle pour contrôler l'introduction de thrips particulièrement difficiles à combattre comme les thrips 'marcheurs' (dont *Echinothrips americanus*, *Heliothrips haemorrhoidalis).*
- Observation des plantes sensibles et réalisation de frappages des feuilles et fleurs sur un papier blanc pour détecter la présence de thrips et déterminer le niveau d'infestation par comptage des individus.
- Installation de plaques engluées pour détecter leur présence au plus tôt afin de mettre en place efficacement la Protection Biologique et Intégrée (PBI). L'utilisation de kairomones peut augmenter l'attractivité des panneaux chromatiques.

Pour que la lutte biologique soit un succès, elle doit être basée sur des actions combinées et préventives, y compris les mesures prophylactiques contre les stades inertes de l'insecte - pronymphe et nymphe (formes de conservation) - dans la couche superficielle du sol (dessous de tablettes, abords de serres…).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Acariens tétranyques :

Cultures florales : cas sur chrysanthèmes petites fleurs, cyclamen, poinsettia, *Euphorbia sp*., *Alcea sp*..

Pépinières : des foyers localisés à étendus sont relevés sur *Pittosporum sp., Euonymus sp., Viburnum tinus, Sarcoccoca sp.*.

Evaluation du risque : les conditions météo plus fraiches et humides sont moins favorables. En effet, les acariens tétranyques profitent des conditions chaudes et d'une hygrométrie faible pour se développer. Surveiller les végétaux sensibles sous abri.

Dégâts : les acariens tétranyques sont des ravageurs qui se nourrissent en vidant les cellules des plantes. Ils possèdent pour cela des pièces buccales de type suceur. Les acariens colonisent généralement le revers des feuilles. Des décolorations correspondant aux plages de cellules vidées apparaissent alors sur la face supérieure des feuilles.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Acariens tétranyques sur rosier

• Autres ravageurs

Cicadelles

Pépinières : le nombre de cas a diminué. Des foyers persistent. Ils sont relevés sur *Callistemon sp., Photinia sp., Pittosporum sp., Fatsia sp., Dracaena sp., Salvia sp., Thymus sp.*.

Evaluation du risque : en piquant les feuilles, les cicadelles engendrent une décoloration voire une déformation du feuillage de certaines plantes et un ralentissement de la croissance des cultures sensibles. Les conditions climatiques chaudes et ensoleillées sont favorables à leur développement. Le risque s'amplifie avec l'augmentation des températures et des ambiances plus sèches. A surveiller pour anticiper la pression éventuelle au printemps prochain.

Piégeage : panneaux englués rouges au-dessus ou au niveau de la culture.

Biocontrôle : voir dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Panneau englué rouge pour la capture des cicadelles

Cochenilles

Cochenilles farineuses relevées sur différents végétaux (*Agapanthus sp.*, *Choisya sp.*, *Euonymus sp.*, *Viburnum sp.*...) et **cochenilles australiennes** sur *Pittosporum sp.* et *Citrus sp.*. *Info +* .

Evaluation du risque : surveiller l'évolution des populations et des auxiliaires présents.

L'identification de l'espèce de cochenille permet de mettre en œuvre une stratégie de lutte raisonnée en fonction de sa biologie et son épidémiologie.

Prophylaxie : élimination des parties infestées voire des sujets très atteints, vide sanitaire et désinfection des locaux, du matériel, des pots..., vérification des jeunes plants reçus.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).




Cochenilles farineuses sur Sarcococca sp.

Cécidomyie sur Agapanthe

La cécidomyie de l'Agapanthe (*Enigmadiplosis agapanthi)* est un diptère originaire d'Afrique du Sud. Elle est présente en Bretagne depuis 2019 et sévit dans les jardins bretons (Cf. BSV Bretagne JEVI du 09/07/2024) ICI.

Les larves de la cécidomyie de l'Agapanthe se développent dans les boutons floraux ce qui induit une décoloration et une déformation des boutons, altérant parfois la floraison.

Cf. fiche de reconnaissance de l'ANSES ICI



Boutons floraux avec symptômes



Cultures florales

- **Chenilles défoliatrices** : observations sur *Anemone sp.* et *Heuchera sp.*. Le risque est à évaluer en fonction de la biologie des espèces de chenilles présentes. A surveiller.
- **Aleurodes :** présence sur poinsettia. Observer particulièrement la face inférieure des feuilles où sont localisées les larves. La pose de pièges jaunes englués permet notamment de repérer la présence des premiers individus ailés. Surveiller les plantes sensibles.

Ravageurs suivis par le réseau de piégeage

• *Duponchelia fovealis*

Observations : 5 pièges à phéromones ont été installés en cultures de cyclamen en région angevine. 4 papillons ont été piégés au cours des 15 derniers jours en région angevine (captures en baisse).

Présence de chenilles détectées par ailleurs sur d'autres sites sur cyclamen. A surveiller.

Piégeage : installer des pièges lumineux UVA ou des pièges à phéromones dès le début de la culture. Il existe 3 types de pièges : piège à eau, piège delta et piège en tube, selon les conditions de culture de l'entreprise.

Prophylaxie :

- bien nettoyer les serres (vide sanitaire, élimination des vieilles plantes et des déchets végétaux...) ;
- surveiller les plantes de négoce et les jeunes plants dès leur arrivée dans l'entreprise, sources potentielles d'infestation ;
- détruire les plantes infestées et ne pas les mettre au compost (retour possible sous forme de papillon dans les serres) ;
- être vigilant aux symptômes de faiblesse (cyclamen qui ne fleurit pas, plante qui fane alors qu'elle est arrosée...).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Source : Fiche ECOPHYTO DEPHY Gérer *Duponchelia fovealis* avec des pièges à phéromone. Y accéder ICI


Papillons de *Duponchelia sp.* sur une plaque engluée d'un piège à phéromones

Maladies cryptogamiques

Oïdium

Cultures florales : quelques cas sur vivaces sensibles.

Evaluation du risque : l'oïdium prolifère avec l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et l'humidité des espaces de culture.

Prophylaxie : parmi les mesures de préventions culturales, proscrire l'excès d'engrais azoté, le confinement de végétation et distancer suffisamment les végétaux en culture hors-sol.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Botrytis

Cultures florales : apparition sur de nouvelles mises en culture.

Evaluation du risque : le temps frais et humide, associé à un déficit de luminosité, favorise le pathogène.

Prophylaxie : maintenir la culture propre en supprimant les débris végétaux sur la plante et au sol, source d'inoculum primaire du *Botrytis*. Eviter l'humidité stagnante et les fortes hygrométries sous abri, couplées à des températures entre 18°C et 23°C. Distancer les végétaux. Ventiler les abris.

Notes nationales biodiversité

Retrouvez toutes les notes nationales ici.

Ecophytopic

Retrouvez l'actualité sur la protection intégrée des cultures en cliquant ici



Note de service DGAL/SDSPV/2026-515 du 26/08/2026 qui liste les produits de biocontrôle : retrouvez-la ICI

RESEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2026

Rédacteur : Noémie JACQUEMIN – Polleniz - noemie.jacquemin@polleniz.fr

Directeur de publication : Philippe DUTERTRE - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.

Comité de relecture : AREXHOR PL, BHR, CAPDL, POLLENIZ, SRAL, RIPERT, FLEURON d'ANJOU, Hélène BRUN (conseiller indépendant).

Observateurs : horticulteurs, pépiniéristes, gestionnaires d'espaces verts, centres horticoles, techniciens, conseillers, formateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CAPDL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles.