

Retours des pluies après une cinquième vague de canicule

Le début du mois d'août est marqué par une nouvelle vague de chaleur, venant une nouvelle fois mettre à rude épreuve des cultures déjà fortement fragilisées. Les conditions de culture du maïs continuent ainsi de se dégrader. L'arrivée des pluies, après le 15 août, permet toutefois de stabiliser l'état des parcelles. Ces précipitations sont les bienvenues, mais interviennent tardivement au regard du stade d'avancement des cultures. Dans ce contexte, de nombreuses parcelles de maïs grain non irrigué sont réorientées vers une valorisation en ensilage. Les situations les plus sèches, ainsi que les parcelles soumises à une irrigation limitante, présentent fréquemment un faible nombre d'épis, confirmant la dégradation du potentiel de rendement. Après une phase de stagnation au stade de la floraison, la maturation des grains s'accélère désormais. Selon les données issues du réseau CéréObs, environ 80 % des surfaces de maïs grain ont atteint le stade correspondant à une humidité du grain de 50 %, avec une dynamique proche de celle observée lors de la campagne 2025.

S = Superficie (1 000 ha) R = Rendement (q/ha) P = Production (1000 q)		Loire Atlantique	Maine et Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Pays de la Loire	
							Total	% 2026/25
Céréales								
Blé tendre	S	48,7	77,6	78,2	84,1	75,7	364,3	+6,4
	R	64	62	70	69	56	64	-5,4
	P	3 113,2	4 810,6	5 476,0	5 799,9	4 235,8	23 435,6	+0,7
Orge d'hiver	S	15,2	18,5	15,5	20,5	12,8	82,4	+20,2
	R	66	63	68	65	58	64	-2,7
	P	1 000,6	1 166,6	1 052,1	1 330,3	743,7	5 293,3	+17,0
Orge de printemps	S	1,4	1,2	0,6	1,0	2,2	6,4	-70,2
	R	52	54	52	52	52	52	+6,9
	P	71,8	65,1	33,2	51,3	114,2	335,5	-68,2
Maïs grain (*) (n.c semences)	S	6,5	12,4	6,4	27,1	23,8	76,1	-42,1
	R	46	57	55	60	54	56	-24,4
	P	300,5	705,6	352,3	1 629,4	1 272,5	4 260,3	-56,5
Avoine	S	2,2	1,3	1,4	1,2	0,4	6,5	=
	R	49	46	49	49	43	48	-8,9
	P	105,2	60,5	70,6	60,9	15,5	312,8	-1,5
Triticale	S	7,6	7,5	7,3	5,0	6,8	34,2	+ 28,5
	R	54	54	56	58	49	54	-6,9
	P	412,1	403,0	408,5	291,9	333,6	1 849,0	+19,7
Blé dur	S	0,1	1,7	0,1	0,2	17,9	20,1	-8,6
	R	53	57	52	52	61	60	-13,7
	P	6,9	98,8	5,9	11,1	1 088,9	1 211,7	-21,2
Toutes céréales	S	85,7	129,5	111,1	142,0	144,3	612,7	-4,7
	P	5 266	7 689	7 497	9 298	8 005	37 756	-12,7
Oléoprotéagineux								
Colza	S	10,2	18,1	17,0	27,1	12,2	84,6	+11,7
	R	33	31	33	36	27	33	-1,0
	P	337,2	562,4	561,1	974,7	328,6	2 764,0	+10,6
Tournesol	S	5,4	14,1	3,9	8,0	24,6	56,1	+14,5
	R	21	21	20	20	21	21	-16,8
	P	114,0	296,2	78,7	159,2	517,3	1 165,4	-3,2
Pois protéagineux	S	0,3	0,3	0,7	1,3	0,5	3,2	-20,8
	R	29	28	28	32	28	30	-12,4
	P	8,6	8,3	20,1	42,7	14,9	94,6	-31,5
Productions fourragères								
Maïs fourrage	S	40,1	28,2	55,4	27,3	37,5	188,5	-8,1
	P	2 697	2 127	3 643	1 800	2 493	12 760	-43,3

Source : DRAAF SRISSE- FranceAgriMer, estimation au 1er septembre 2026